

Bienvenido a FIS Petrocinado Por

FIS Fish Information & Services **SKRETTING** Feeding your passion for fish

Suscribirse a FIS | Regístrate en FIS | Anuncie en Fis | Newsletter | Acerca de FIS | Contáctenos Language

Buscar en FIS

→ Noticias

Buscar por fecha: [dropdown] | Buscar por país: Todos [dropdown]

HOME

NOTICIAS

COMPAÑÍAS Y PRODUCTOS

DIRECTORIO COMPAÑÍAS

OFERTAS Y CLASIFICADOS

FERIAS Y EXHIBICIONES

GENTE CON OPINIÓN

CHEQ. DE MERCADO

PRECIOS DE MERCADO

REPORTE DE MERCADO

ACUICULTURA

REGISTRARSE

user: [input] | clave: [input] | ¿Olvidó su clave?

GENTE CON OPINION

Marie Christine Monfort

La Igualdad de género es un elemento irrevocable de la sostenibilidad de los productos pesqueros



Tiburón en aguas profundas del Pacífico. (Foto: NOAA)

Capturas del arrastre de fondo son 42 % mayores que las informadas, según un estudio

CANADÁ
Saturday, April 14, 2018, 00:40 (GMT + 9)

marel

ADVERTISE IN FIS

MAS ARTICULOS

España
Apr 17, 02:50 (GMT + 9): EN BREVE - Fin de la costera de verdel

Estados Unidos
Apr 17, 02:50 (GMT + 9): Cooke no podrá volver a sembrar salmones en su granja de isla Cypress

Indonesia
Apr 17, 02:00 (GMT + 9): EN BREVE - Indonesia detiene 26 barcos por pesca ilegal en lo que va de año

Chile
Apr 17, 02:00 (GMT + 9):

FERIAS DESTACADAS

FOOD & TASTE THE WORLD SAVOR ASIA
29 May - 02 June 2018

APA 18 TAIWAN
APRIL 23-26

AQUA 2018
FRANCE AUGUST 25 - 29

MARICULTURE

marel

Follow us on **twitter**

Follow us on **FACEBOOK**

Unos 25 millones de toneladas de peces que viven a 400 metros o más bajo el nivel del mar han sido extraídas utilizando gigantescas redes de arrastre en las últimas seis décadas, lo que ha provocado el colapso de muchas de esas poblaciones de peces, señala un nuevo informe.

El estudio, que se basa en los datos de captura del periodo comprendido entre los años 1950 y 2015, reconstruidos por el proyecto [Sea Around Us](#), también revela que los países han capturado un 42 % más de pescado que el informado a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

"Nuestro estudio muestra que hay un subregistro sistemático de la captura real. Esto significa que los administradores de pesquerías están tomando decisiones fundadas en datos incorrectos, lo que tiene consecuencias serias para los ecosistemas marinos", explica Lissette Victorero, autora principal del artículo y estudiante de doctorado en el Centro Nacional de Oceanografía del Reino Unido.

El estudio examina el estado de 72 especies de peces de aguas profundas capturadas por arrastreros de fondo en todo el mundo, muchas de los cuales fueron explotadas a niveles insostenibles.

Un ejemplo presentado en el análisis es el granadero de roca, cuyas capturas estimadas fueron superiores a 60.000 toneladas en 2001 en el Atlántico nororiental, pero la población fue sobreexplotada tan rápido que se tuvo que se imponer una moratoria en 2006 en aguas noruegas.

"Una de las razones de este colapso es el hecho de que las redes de arrastre no son selectivas, es decir, capturan todo y cualquier cosa, lo que significa que los granaderos jóvenes que aún no han alcanzado el desarrollo reproductivo completo son capturados junto con granaderos adultos, con lo que disminuye la capacidad de la población para recuperarse", explica Deng Palomares, coautora del estudio y gerente del Proyecto Sea Around Us en la Universidad de Columbia Británica.

Al respecto, la investigadora señala que la mayoría de las pesquerías analizadas duraron menos de una década o dos décadas porque los peces de aguas profundas en general tienen baja fecundidad, crecen muy lentamente y viven alrededor de los montes submarinos y crestas que son arrasadas por arrastre.

Aparte de reducir las poblaciones, la pesca de arrastre de fondo no genera mucho en términos de pescado comercializable. Los individuos inmaduros son devueltos al mar porque generalmente no cumplen con los requisitos mínimos de tamaño, y lo mismo sucede con las especies no objetivo capturadas como bycatch.

Las nuevas estimaciones presentadas por los investigadores sugieren que durante el período de estudio se

descartaron 6 millones de toneladas de pescado, mientras que las pesquerías de aguas profundas solo contribuyeron con el 0,5 % de los desembarques pesqueros totales.

"Esto significa que a nivel mundial su importancia económica es trivial", subraya el informe. La necesidad de mantener el negocio en marcha a pesar de su inviabilidad financiera impulsa a las flotas a buscar continuamente nuevas especies para pescar, en particular una vez que han agotado un stock o están sujetas a nuevas regulaciones.

"Entonces, lo que estamos viendo es un ciclo en el que los arrastreros comienzan a dirigir sus capturas a peces que ya estaban extrayendo como captura incidental. Crean nuevos mercados para ellos hasta que también agotan esos stocks con regulaciones que quedan rezagada", apunta la autora principal del estudio.

Los científicos que participaron en la investigación recalcan que el impacto de la pesca de arrastre va más allá de la captura de poblaciones de peces. A medida que son arrastradas por el fondo del mar, las redes de arrastre eliminan esponjas, corales, estrellas de mar, pepinos de mar y anémonas, todos los cuales juegan un papel importante como fuente de alimento o hábitat para los peces. También destruyen los montes submarinos y otros refugios de los peces, convirtiendo antiguos hábitats prósperos en grandes áreas despejadas.

"Mucha más biomasa de peces y especies que forman hábitats ha sido removida de las profundidades marinas, respecto de lo que pensamos. Esto ha alterado el ecosistema de maneras que aún no comprendemos", concluye Palomares.

Las conclusiones del estudio fueron publicadas en la revista *Frontiers in Marine Science*.

editorial@fis.com
www.fis.com

Link:

<http://www.fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=14&id=96826&l=s&special=&ndb=1%20target=>