

Instrucciones para el estudio Bravo PH

Esta información ha sido preparada para asistirle. Por favor léala a fondo. Para hacer preguntas, en cualquier momento, por favor llame al 214-645-0595.

TRANSPORTACIÓN:

Usted será sedado para el procedimiento. **No se le permitirá conducir de regreso a su casa. Favor de hacer arreglos para que alguien le traiga, permanezca con usted durante el procedimiento y le lleve de regreso a su hogar después del procedimiento.** Cuento con aproximadamente 2 – 3 horas desde el momento de su llegada hasta su salida.

REGISTRO:

Para completar su registro, usted recibirá una llamada para constatar su información médica y para informarle sobre algún cobro del establecimiento, aparte de la cantidad ya cubierta por su compañía de seguros.

MEDICAMENTOS:

A menos que usted haya sido instruido de otra forma, **NO** tome ninguno de los siguientes inhibidores de protones (p. ej. Omeprazole, Prilosec, Nexium, Prevacid, Aciphex, Protonix) durante los 5 días antes del procedimiento. **NO** tome ninguno de los siguientes bloqueadores de H2 (p. ej. Tagamet, Zantac, Ranitidine, Pepcid, Axid) durante los 2 días antes del procedimiento. **NO** tome aspirina o algún producto que contenga aspirina, durante los 5 días antes de su procedimiento. **NO** tome insulina el día de su procedimiento. Por favor **TOME** sus medicamentos para la presión sanguínea y/o corazón la mañana del procedimiento, con solo un sorbo de agua, aun si el medicamento está programado para la mañana.

PREPARACIÓN:

La noche antes del procedimiento usted puede comer como normalmente lo hace hasta las 6:00pm. Después de las 6:00pm necesitará seguir una dieta de líquidos claros. Líquidos claros incluyen jugo de manzana, jugo de uvas blancas, caldo, "Gatorade", soda, gelatina, paletas heladas, café, té (sin leche o crema). **FAVOR DE NO COMER O BEBER NADA COLOR ROJO.** Usted puede continuar tomando líquidos claros hasta 2 horas antes de su hora de llegada programada.

Durante el procedimiento, una sonda Bravo PH será anexada a su esófago utilizando un endoscopio superior.

DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO:

Es posible que se sienta lleno debido al aire que fue introducido en su estómago durante el procedimiento. Esto pasará una vez que expulse el aire. Usted podrá comer después de salir del establecimiento donde le harán la endoscopia a menos que su médico le indique lo contrario.

Durante 48 horas después de la adhesión de la sonda Bravo PH, usted llevará un dispositivo que registrará continuamente el nivel de PH en su esófago (un indicador de reflujo ácido). Después de completar el estudio, la sonda Bravo PH se caerá del revestimiento de su esófago y pasará de forma natural a sus heces.

Devolver el dispositivo de grabación (no la sonda) a la clínica. Una vez el dispositivo haya sido devuelto, los datos serán descargados y leídos por su médico. Nosotros le llamaremos con los resultados, los cuales podrían demorar hasta 2 semanas.

Rev. 20160218